



Antrag des Landesvorstandes an die Jahreshauptversammlung am 22. April 2017 in Wolmirstedt zur Impfung gegen alle Varianten der RHDV-2

Der Landesvorstand des Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. ersucht die Jahreshauptversammlung zu beschließen, dass auf allen Kaninchenausstellungen im Landesverband nur Tiere zugelassen werden, die **gegen alle Varianten der RHD wirksam geimpft** sind.

Begründung:

Bisher wurden auf den Ausstellungen im Landesverband der Kaninchenzüchter Sachsen-Anhalt die Impfung gegen die klassische RHD gefordert. Dieser Impfschutz reicht seit dem Jahr 2016 nicht mehr aus, da die klassische RHD durch die RHDV-2 verdrängt wurde. Eine einmalige Impfung mit einem monovalenten oder kombinierten Impfstoff z.B. dem von IDT Dessau-Roßlau bietet keinen ausreichenden Schutz, um unsere Kaninchen vor dieser Krankheit zu schützen.

Das Friedrich-Löffler-Institut, als zuständige Börde für die Tiergesundheit in der Bundesrepublik Deutschland, hat in seiner im Jahr 2016 veröffentlichten Hinweisen daraufhin gewiesen, dass im vergangenen Jahr ein bundesweit flächendeckender Ausbruch der RHDV-2 festgestellt wurde.

Insgesamt bestehen drei Möglichkeit der Impfung, um unsere Kaninchen zu schützen (siehe Anlage), so dass jede Züchterin/jeder Züchter in die Lage versetzt wird, einen wirksamen Impfschutz für seine Tiere zu garantieren.

Mike Hennings

Mike Hennings
Vorsitzender des LV Sachsen-Anhalt



Impfvarianten die wirksam vor alle Varianten der RHD 1+2 schützen

	Impfzyklus	Impfstoff	Herstellerland	Bemerkungen
Variante 1	1. Impfung	Filavac VHD K C+V	Frankreich	<i>Ausnahmegenehmigung des Landwirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt, <u>bis zur deutschlandweiten Zulassung, erforderlich!</u></i>
	2. Wiederholung nach 12 Monaten	Filavac VHD K C+V	Frankreich	
Variante 2	1. Impfung	Cunivak RHD oder RIKA-VACC RHD (nur der Mono-, kein Kombiimpfstoff)	Deutschland	Kann durch jeden zugelassenen Tierarzt verimpft werden.
	2. Impfung nach 3-4 Wochen der 1. Impfung			
	3. Impfung	Cunipravic RHD variant	Spanien	
	4. Wiederholung nach 6 Monaten	Impfungen 1. und 3. müssen alle 6. Monate wiederholt werden!		
Variante 3	1. Impfung	Cunivak RHD oder RIKA-VACC RHD (nur der Mono-, kein Kombiimpfstoff)	Deutschland	Kann durch jeden zugelassenen Tierarzt verimpft werden.
	2. Impfung nach 3-4 Wochen der 1. Impfung	Cunivak RHD oder RIKA-VACC RHD (nur der Mono-, kein Kombiimpfstoff)	Deutschland	
	3. Wiederholung nach 6 Monaten	Cunivak RHD oder RIKA-VACC RHD (nur der Mono-, kein Kombiimpfstoff)	Deutschland	